

ACIDOFOAM CF

1448/14/02/13/E1

PRESENTATION

Liquide incolore.

APPLICATIONS

Nettoyage et désinfection acide de surfaces et équipements par application moussante. Le produit peut être appliqué sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (TP04), convient pour l'hygiène vétérinaire (TP03) et peut être utilisé comme désinfectant non destiné à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux en général (TP02).

COMPOSITION

Mélange stabilisé contenant 3,2 % p/p d'acide peracétique, ca. 20 % p/p de peroxyde d'hydrogène et des tensioactifs du type non ionique moussants biodégradables.

L'ACIDOFOAM CF a été certifié NSF. Ce produit peut être utilisé comme un détergent acide (A3) à l'intérieur et aux alentours des zones de transformation des aliments, là où son utilisation n'est pas destinée au contact direct avec les aliments. L'utilisation de ce produit dans les zones de transformation ou de manipulation des aliments nécessite que tous les produits alimentaires et matériaux d'emballage soient retirés ou protégés avant l'utilisation du produit. Un rinçage à l'eau potable des surfaces nettoyées est requis après utilisation du produit. Si le produit a été appliqué selon les instructions du fabricant, aucune odeur ne doit en émaner et aucun résidu ne doit être visible.

L'ACIDOFOAM CF est approuvé et listé comme désinfectant pour l'élevage par la Société de Médecine Vétérinaire allemande (DVG).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

SOPURA
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 Courcelles - Belgium
Tel. +32 71 46 80 10
Fax +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

SOPURA
NO RISKS. ONLY RESULTS.

Nonfood Compounds
Program Listed: A3
Registration Number: 160139



ACIDOFOAM CF

1448/14/02/13/E2

PROPRIETES

- ✓ L'ACIDOFOAM CF a une forte action biocide sur les levures, les moisissures, les bactéries pathogènes et non pathogènes Gram+ et Gram-. De plus, le produit est également un agent sporicide et virucide efficace comprenant des bactériophages.
- ✓ L'ACIDOFOAM CF forme une mousse stable à haute densité (15 à 30 minutes suivant la nature du support).
- ✓ L'ACIDOFOAM CF possède de bonnes propriétés mouillantes et une excellente rinçabilité.
- ✓ L'ACIDOFOAM CF peut être utilisé sur l'acier inoxydable et la majorité des matériaux utilisés pour les joints (EPDM, FPM) conformément aux conditions d'utilisation préconisées, telles que la concentration, la température et le temps de contact.
- ✓ L'ACIDOFOAM CF protège les aliments destinés aux humains et aux animaux contre les contaminations croisées provoquées par le contact avec des surfaces infectées.

Ce produit répond aux législations nationale et européenne relatives en vigueur aujourd'hui et peut être utilisé et appliqué sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les boissons, de la ferme à l'industrie alimentaire (brasserie, soft drink, légumes, fruits, viandes, poissons, plats préparés, aliments pour animaux, etc.).

SOPURA
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 Courcelles - Belgium
Tel. +32 71 46 80 10
Fax +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

SOPURA
NO RISKS. ONLY RESULTS.

CONCENTRATIONS D'EMPLOI

Concentration :	2,0 – 8,0 % v/v.
Température :	ambiante.
Durée de contact :	5 – 60 minutes.

Les surfaces/équipements à traiter doivent être nettoyés avant la désinfection. Application à l'aide d'un canon à mousse. Eviter une concentration excessive pour limiter l'odeur de l'acide peracétique.

DOSAGE

Une méthode avec test kit ou via titration est disponible. De plus amples informations sur la méthode et le test kit peuvent être obtenues auprès du responsable technique SOPURA en charge de votre région.

Poids spécifique : 1,110 ± 0,015.



ACIDOFOAM CF

1448/14/02/13/E3

PROPRIETES BIOCIDES

EN 1276
Activité bactéricide en suspension (log 5) en présence de charge organique faible.
Souches testées : *S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, L. brevis, S. typhimurium, P. damnosus, E. cloacae, L. monocytogenes, C. jejuni.*

Concentration	Condition	Température	Durée
0,25 % v/v	0,3 g/l albumine	20°C	5 min.
1,00 % v/v		4°C	

EN 1650
Activité levuricide en suspension (log 4) en présence de charge organique faible.
Souches testées : *Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cer. diastaticus, C. albicans.*

Concentration	Condition	Température	Durée
0,12 % v/v	0,3 g/l albumine	20°C	15 min.
0,12 % v/v		4°C	

EN 13697
Activité sur surface non-poreuse en présence de charge organique faible.
Bactéries testées (log 4) à 20°C : *S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli.*
Bactéries testées (log 4) à 4°C : *S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, L. brevis, P. damnosus, E. cloacae, S. typhimurium, L. monocytogenes.*
Moisissures testées (log 3) : *A. brasiliensis (ex. niger).*
Levures testées (log 3) : *C. albicans.*
Spores testées (log 3) : *B. subtilis, B. cereus, Clostridium sporogenes.*

Type d'activité	Conc.	Condition	Temp.	Durée
Bactéricide	1,50 % v/v	0,3 g/l albumine 0,85 % p/p lait écrémé pour *P. aeruginosa*	20°C	5 min.
	1,50 % v/v		4°C	15 min.
Fongicide	0,50 % v/v	0,3 g/l albumine	20°C	15 min.
Levuricide	0,25 % v/v	0,3 g/l albumine	20°C	15 min.
Sporicide	2,00 % v/v	0,3 g/l albumine	20°C	60 min.

SOPURA
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 Courcelles - Belgium
Tel. +32 71 46 80 10
Fax +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

SOPURA
NO RISKS. ONLY RESULTS.



ACIDOFOAM CF

1448/14/02/13/E4

PROPRIETES BIOCIDES (SUITE)

EN 13610

Activité virucide contre les bactériophages (log 4) en présence de charge organique faible.

Souches testées : Bactériophages P001 et P008 du *Lactococcus lactis.*

Concentration	Condition	Température	Durée
0,50 % v/v	10 g/l solution de petit-lait acide	20°C	15 min.

EN 14476

Activité virucide en suspension (log 4) en présence de charge organique faible. Souches testées : Poliovirus type 1, Adénovirus type 5, norovirus murin MNV (non enveloppé).

Concentration	Condition	Température	Durée
8,0 % v/v	3 g/l albumine	20°C	5 min.
2,0 % v/v			60 min.

Lignes directrices DVG

Activité virucide sur surface poreuse (log 4) en présence de charge organique faible. Souches testées pour les virus enveloppés : virus de la vaccine, virus de la maladie de Newcastle (NDV).

Souches testées du virus non enveloppé : ECBO, Réovirus type 1.

Température	Durée d'exposition	Concentration	
		Virus non enveloppé (activité virucide complète)	Virus enveloppé (activité virucide limitée)
10°C	30 min.	2,0 % v/v	1,5 % v/v
	60 min.	1,5 % v/v	
	120 min.	1,0 % v/v	

Ces résultats micro sont mentionnés pour démontrer la conformité de l'ACIDOFOAM CF au règlement européen en matière de biocides. Les concentrations d'usage et les durées de contact recommandées ont été déterminées afin que le produit soit efficace dans des conditions pratiques.

SOPURA
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 Courcelles - Belgium
Tel. +32 71 46 80 10
Fax +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

SOPURA
NO RISKS. ONLY RESULTS.



ACIDOFOAM CF

1448/14/02/13/E5

CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT CONCENTRE

- ✓ Stocker verticalement.
- ✓ Stocker à l'abri des sources de chaleur et des rayons du soleil directs.
- ✓ Si du produit est retiré de son emballage, il ne peut en aucun cas y être replacé. Ne pas mettre le produit commercial en contact avec des matières organiques (graisses, papier, caoutchouc, etc.). Pour le transvaser, n'utiliser que des récipients propres fabriqués avec du matériel adapté.
- ✓ L'ACIDOFOAM CF peut être stocké dans des contenants en PE-HD ou PP. Les équipements et circuits de dosage peuvent contenir du PE-HD, PP et de l'acier inoxydable 304 ou 316[(1)]. Le produit concentré est compatible avec le PTFE (Teflon), FPM (Viton) et PVDF. L'utilisation de l'EPDM n'est pas recommandée.
- ✓ Température de cristallisation : -10°C.
- ✓ Le produit doit être stocké à des températures inférieures à 30°C afin d'éviter sa dégradation rapide dans toute la chaîne d'approvisionnement (transport - entrepôt - point d'utilisation). Dans les pays où la température moyenne dépasse 30°C pendant certaines ou toutes les saisons, le produit doit être stocké dans un local frais et bien ventilé.
- ✓ La durée de vie du produit, indiquée sur l'étiquette, est uniquement garantie sous les conditions de stockage recommandées (< 30°C).

EMBALLAGE

Bouteille – Jerricane – Fût – IBC (avec bouchon à évent).

PREMIERS SECOURS – PREPARATION DANGEREUSE – TRANSPORT

Voir fiche de données de sécurité.

SOPURA
Rue de Trazegnies 199
B – 6180 Courcelles - Belgium
Tel. +32 71 46 80 10
Fax +32 71 45 25 90
E-mail : sales@sopura.com

SOPURA
NO RISKS. ONLY RESULTS.

[(1)] SOPURA ne peut pas être tenu pour responsable en cas de défaut caché de l'acier inoxydable ou de soudures inadéquates.